

琉球大学学術リポジトリ

Usefulness of separately evaluating lymphatic and venous vessel invasion in cervical adenocarcinoma

メタデータ	言語: 出版者: University of the Ryukyus 公開日: 2021-04-20 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: Taira, Yusuke, 平良, 祐介 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/48289

Table 3 Proportional hazard regression analyses for prognosis

Variables	DFS			OS		
	HR	95% CI	<i>p</i> -value	HR	95% CI	<i>p</i> -value
Age ≥46 years	0.881	0.349–2.205	0.785	1.240	0.235–7.001	0.797
FIGO stage IB2, II	3.192	1.208–8.328	0.0199	5.144	1.105–27.30	0.0370
CSI ≥2/3	2.408	0.847–7.469	0.101	4.729	0.621–105.4	0.144
Lymph node metastasis	4.798	1.773–13.06	0.0022	7.865	1.500–49.85	0.014
Lymph vessel invasion	1.736	0.589–5.097	0.313	4.009	0.699–33.08	0.121
Venous invasion	1.528	0.535–4.197	0.421	1.009	0.144–6.455	0.992

DFS; disease-free survival, OS; overall survival, HR; hazard ratio, CI; confidence interval, FIGO; the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, CSI; cervical stromal invasion