

琉球大学学術リポジトリ

Usefulness of separately evaluating lymphatic and venous vessel invasion in cervical adenocarcinoma

メタデータ	言語: 出版者: University of the Ryukyus 公開日: 2021-04-20 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: Taira, Yusuke, 平良, 祐介 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/48289

Table 4 Multiple logistic regression analyses for pelvic and distant recurrences

Variables	Pelvic recurrence			Distant recurrence		
	OR	95% CI	<i>p</i> -value	OR	95% CI	<i>p</i> -value
Age ≥46 years	0.431	0.0978–1.694	0.229	1.294	0.285–6.096	0.736
FIGO stage IB2, II	1.775	0.408–9.768	0.459	6.437	1.443–36.14	0.0143
CSI ≥2/3	3.742	0.836–18.19	0.0840	2.455	0.459–36.14	0.295
Lymph node metastasis	16.98	3.669–97.31	0.0002	1.321	0.233–6.617	0.743
Lymph vessel invasion	2.609	0.529–16.69	0.248	4.012	0.826–23.35	0.0855
Venous invasion	2.240	0.459–10.41	0.309	9.290	2.067–49.38	0.0036

OR; odds ratio, CI; confidence interval, FIGO; the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, CSI; cervical stromal invasion