

琉球大学学術リポジトリ

沖縄島におけるチョウセンメジロの初記録

メタデータ	言語: ja 出版者: 琉球大学資料館 (風樹館) 公開日: 2023-01-23 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 青柳, 克 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002019593

沖縄島におけるチョウセンメジロの初記録

青柳克

沖縄昆虫同好会

要旨 . 2021年12月末, 沖縄県浦添市の森林域でチョウセンメジロ *Zosterops erythropleurus* を目撃した. 沖縄県内における本種の記録は離島に限られており, 本観察は沖縄島における初記録である.

はじめに

チョウセンメジロ *Zosterops erythropleurus* Swinhoe, 1863 は, スズメ目 Passeriformes メジロ科 Zosteropidae に属する体長約 10.5cm の小型鳥類であり, 東部アムール地方, ウスリー地方, 中国東北区で繁殖し, 冬季は中国南部, インドシナ半島などに渡る (高野 1981). 国内では, 北海道, 本州 (新潟県, 石川県, 福井県, 島根県), 飛鳥 (秋田県沖), 舩倉島 (石川県沖) などの主に日本海側の地域から記録されている旅鳥もしくは迷鳥である (日本鳥学会 2012). 沖縄県では, 与那国島で 2004–07 年に複数の観察記録がある (宇山 2011) のみであり, それ以外の島嶼からの記録は無かった (例えば, 日本鳥学会 2012; 沖縄野鳥研究会 2010; 砂川 2011; 小林 2021 など). 今回, 著者は, 沖縄島で本種を目撃したので, 同島からの初記録として報告する.

目撃記録

2021年12月末から翌年1月初めにかけて, 浦添市内の森林域にてチョウセンメジロを目撃した. 場所は, 浦添大公園内の墓地が立ち並ぶ一帯に隣接した林縁部 (座標 26°15' 07. 3" N, 127°43' 38. 2" E 及びその付近) であった. 目撃内容の詳細を表1にまとめた.

これ以降, 1月3日, 8日, 9日, 10日, 15日及び16日の計6日にわたって, 早朝に発見場所及びその付近を探索したが, チョウセンメジロを確認することはできなかった.

表1 沖縄島 (浦添市) におけるチョウセンメジロの目撃内容.

年月日	時刻	内容
2021年12月30日	午前8時50分頃	葉が密生する樹木の枝で, リュウキュウメジロ <i>Z. japonicus loochooensis</i> 4–5羽に交じって, 羽繕いする1個体を目撃.
12月31日	午前8時40分頃	ギンネムの枝でリュウキュウメジロ4~5羽, オキナワシジュウカラ <i>Parus minor okinawae</i> 2羽に交じって, 探餌する1個体を目撃.
2022年1月2日	午前8時30分頃	31日と同様の群れに交じり, 林縁を移動する1個体を目撃.



図1. チョウセンメジロ (浦添市にて撮影)

Fig. 1. *Zosterops erythropleurus* photographed at Urasoe City, Okinawa Prefecture.

種同定

目撃した個体 (図1) の頭部や背面などの色彩はメジロ *Z. japonicus* に酷似していたが, 嘴の両側が黄色を呈すること, 脇に明瞭な赤褐色の大きな斑をもつこと (水谷・叶内 2017; 高野 2008) から, チョウセンメジロと同定した.

謝辞

有益なご助言を頂いた匿名の査読者の方に御礼申し上げます.

引用文献

小林雅裕, 2021. 石垣島の野鳥図鑑. メイツユニバーサルコンテンツ, 東京.
水谷高英・叶内拓哉, 2017. フィールド図鑑 日本の野鳥. 文一総合出版, 東京.

- 日本鳥学会, 2012. 日本鳥類目録 改訂第7版. 日本鳥学会, 兵庫.
- 沖縄野鳥研究会, 2010. 改訂版 沖縄の野鳥. 新星出版, 沖縄.
- 砂川栄喜, 2011. 沖縄 宮古の野鳥 亜熱帯の水辺, 山野の鳥. ボーダーインク, 沖縄.
- 高野伸二, 1981. カラー写真による日本産鳥類図鑑. 東海大学出版会, 東京.
- 高野伸二, 2008. フィールドガイド 日本の野鳥 増補改訂版. 日本野鳥の会, 東京.
- 宇山大樹, 2011. 野鳥の記録 与那国島 2002年3月～2007年1月の678日間の観察記録. 文一総合出版, 東京.

New record of the Chestnut-flank White-eye (*Zosterops erythropleurus* Swinhoe, 1863) from Okinawa-jima Island, Ryukyu, Japan.

Masaru Aoyagi

Okinawa Entomological Society

Abstract. At the end of December 2021, a Chestnut-flank White-eye (*Zosterops erythropleurus*) was observed in a forest at Urasoe City, Okinawa Prefecture. This is the first record of this species from Okinawa-jima Island.

投稿日 : 2022 年 4 月 20 日
受理日 : 2022 年 10 月 25 日
発行日 : 2023 年 1 月 21 日